


## PACIENTES

# Los pacientes con dehiscencia de prótesis ya no tendrán que pasar por el quirófano

Publicado: 04-10-2010 11:55:05



Los pacientes con una prótesis valvular mitral ya no tendrán que pasar necesariamente por quirófano para corregir defectos o dehiscencias de las suturas protésicas. Actualmente existe otra alternativa, el cierre por cateterismo percutáneo o sin intervención, que ha demostrado su eficacia y evita complicaciones. Y es que la dehiscencia de las prótesis en el corazón es una alteración que tienen hasta un 10% de los pacientes a los que les son implantadas prótesis valvulares.

Recientemente acaba de ser publicado un estudio, bajo el título *Percutaneous Valvular Leak Repair*, que pone de manifiesto la utilidad de este método en una serie de pacientes que actualmente es la más grande de las recopiladas en el mundo.

Esta opción terapéutica es muy importante para el paciente que tiene así una recuperación más rápida. Tal como se demuestra en este trabajo, el control de la intervención con ecocardiografía tridimensional es básica no sólo para establecer la indicación de este tipo de intervencionismo, sino que “también, apunta el doctor Miguel Ángel García Fernández, del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Española de Imagen Cardíaca (AEIC), facilita el trabajo del hemodinamista, que antes de la intervención puede conocer las características anatómicas del orificio para planificar bien el procedimiento terapéutico y definir qué tipo y cuántos dispositivos debe colocar”.